

Tipps zur Anlage der Blumenwiesen



Die Saatbettvorbereitung

Vor einer Neusaat muss die «alte» Pflanzengesellschaft restlos beseitigt werden (umgraben, abschälen, hacken, pflügen, fräsen etc.) – entweder auf der ganzen Fläche oder auch nur in Streifen oder Inseln. Am besten beseitigt man die bestehenden Pflanzen mindestens einen Monat vor der Einsaat mit einer Bodenfräse oder mit der Schaufel. Noch besser ist es, wenn die anzusäenden Flächen bereits im Herbst vor dem Aussaatjahr bearbeitet werden.

Zwei bis drei Wochen nach der Bodenbearbeitung beginnt die Spontanflora (Unkraut) schon wieder zu spriessen. Das keimende Unkraut lässt sich am einfachsten mit Hilfe eines Pendelhackens, Gartenrechens oder eines Kräuels beseitigen. Diese oberflächliche Bearbeitung sollte bei Bedarf im Abstand von einigen Wochen wiederholt werden. **Achtung: Die Fläche darf nicht mehr tief bearbeitet werden (max. 3 cm).** Nach der ersten tiefen Bodenbearbeitung (bei der der alte Bewuchs vernichtet wurde) sollte sich der Boden bis zur Saat mindestens 4 Wochen lang absetzen können.

Am Tag der Aussaat muss die ganze Fläche ein letztes Mal ganz oberflächlich bearbeitet werden.

Die Saat

Ideal ist die Zeit zwischen **April und Mitte Juni**, frühere oder spätere Saaten führen meistens zu einem Artenverlust oder zu einer Gräserdominanz.

Die Saatmenge von **10 Gramm pro Quadratmeter darf nicht überschritten werden.**

Das benötigte Saatgut wird halbiert. Dann besät man mit der ersten Hälfte des Saatgutes die ganze Fläche. In einem **zweiten Arbeitsgang** wird nochmals die ganze Fläche mit dem Rest des Saatgutes besät. Das erste Mal schreitet man die Parzelle in Längsrichtung ab, das zweite Mal in Querrichtung. Das Saatgut wird oberflächlich ausgestreut. **Die frische Saat darf weder zugedeckt noch eingereicht werden.** Nach der Aussaat brauchen die Samen Erdkontakt. Darum wird die ganze Fläche **sorgfältig gewalzt** oder mit einer Schaufel gut **angeklopft**.



Geduld haben

Wildkräuter brauchen **4 bis 8 Wochen** Zeit, ehe sie auskeimen. Das spontan wachsende Unkraut ist jedoch schon nach 2 bis 3 Wochen sichtbar. Eine neu ausgesäte Wildblumenwiese blüht erstmals nach einer Überwinterung. Deshalb sieht eine Neuanlage im Aussaatjahr sehr kahl aus und der Deckungsgrad ist ungenügend. Beim flüchtigen Betrachten sieht der Laie **im Aussaatjahr nur Unkraut**. Das muss so sein!

Unkraut

Das Unkraut schützt die Saat vor direkter Sonneneinstrahlung und Gewitterregen. Das Jäten verursacht in diesem Stadium mehr Schaden als Nutzen. **Deshalb niemals jäten!**

Bewässerung

Eine frisch gesäte Blumenwiese darf im ersten Jahr (und auch in den Folgejahren) auch bei grosser Trockenheit **nicht bewässert werden**.


Schnecken


Sie lieben auskeimende Wildpflanzen. Die Tiere sind aber meist so anständig, dass sie nie den ganzen Bestand vernichten: Also **keine Schneckenkörner** streuen!

Unkrautschnitt im Aussaatjahr

Sobald kein Licht mehr auf den Boden fällt, ist es Zeit für den ersten Säuberungsschnitt. Dies trifft **etwa 8 Wochen nach der Aussaat** zu, wenn der Bestand etwa kniehoch aufgewachsen ist. Die Schnitthöhe beträgt etwa 8 cm. Das Schnittgut wird sorgfältig zusammengenommen und entsorgt. Der Säuberungsschnitt kann auch mit einem hochgestellten Rasenmäher mit Fangsack durchgeführt werden. Je nach Bodentyp und Nährstoffangebot sind im Aussaatjahr mehrere Säuberungsschnitte nötig.

Im Mai des nächsten Jahres dürfen Sie sich an Ihrer traumhaft schönen Wildblumenwiese erfreuen und den **ersten Wiesenblumenstrauß** pflücken.





Pflege nach der ersten Überwinterung

Der erste Heuschnitt ist je nach Standort nach dem Verblühen der wichtigsten Gräser angebracht, das heisst im Mittelland etwa **ab Mitte Juni**. Das Schnittgut (Bodenheu) wird 3 Tage auf der Parzelle getrocknet und kann dann als duftendes, strukturreiches Tierfutter genutzt werden. Weitere Schnitte sind im Sommer und manchmal auch im Frühherbst nötig. Die Wiese darf weder frisch gemäht noch ungemäht eingewintert werden.

Tipp für einen höheren Artenreichtum

Am meisten Arten können sich in einer Wildblumenwiese entwickeln, wenn der erste **Schnitttermin jedes Jahr etwas variiert**: Man darf durchaus in einem Jahr schon Ende Mai mähen, wenn man im nächsten Jahr mit dem Heuen bis Ende Juni warten kann.

Saatgut

Je nach Standort und Bodenbeschaffenheit gibt es unterschiedliche UFA-Mischungen (erhältlich z.B. bei LANDI)

Links

[Blumenrasen statt Rasen?](#)

[UFA Samen – Reichblühende Wildblumenmischungen](#)

Benötigen Sie eine Beratung? Wir helfen gerne weiter. Schreiben Sie uns eine Mail an naturinfo@naturmuseumsg.ch

Naturinfo Newsletter

[Abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter!](#)